

LABO XV Système Qualité 353, rue de Vaugirard 75015 PARIS	PROCEDURE POUR L'EXAMEN PARASITOLOGIQUE DES SELLES FRAICHES (Site Vaugirard uniquement)	C2-PR 02-C Mis en application le : 10/02/2025 Revu le : 10/03/2025 Imprimé le : 10/03/2025
--	---	---

PROCÉDURE POUR L'EXAMEN PARASITOLOGIQUE DES SELLES FRAICHES

La nouvelle nomenclature d'avril 2019 recommande l'examen des 3 selles différentes émises à au moins 24 heures d'intervalle :

À votre domicile : 2 selles à apporter

- Il vous faut recueillir à votre domicile 2 selles à 24h d'intervalle (la veille et l'avant-veille par exemple mais pas obligatoire).
- Recueillir l'équivalent d'une "mandarine" de selles dans un bocal transparent (il n'a pas besoin d'être stérile mais bien lavé) à chaque fois.
- Conserver les 2 selles au frais au bord de la fenêtre, ou en bas du réfrigérateur.

Au laboratoire ou à domicile :

- Vous habitez à moins de 2h de trajet du laboratoire Vaugirard : vous pouvez à ce moment-là faire la selle chez vous dans un contenant, style tupperware, que vous mettez au fond du WC. Par contre, il faudra bien la garder au chaud dans une couverture ou un sac isotherme et nous l'amener le plus tôt possible. (Pensez à prendre avec vous les deux autres conservées au frais).
- Vous habitez trop loin, vous pouvez venir faire une selle dans notre laboratoire, qu'on recueillera et qu'on examinera tout de suite.
Nous ne pouvons plus donner de purgatif, par contre vous pourrez prendre un petit déjeuner à base de laitage et/ou œufs et/ou bacon et/ou soja et/ou jus d'orange pour stimuler l'exonération.

Recommandations annexes :

1) FAIRE RÉALISER LES EXAMENS DE SELLES DE PRÉFÉRENCE AVANT TOUTE INVESTIGATION DIGESTIVE par imagerie (Fibroscopie ; Coloscopie ; Transit du grêle) ou au moins une semaine après cette investigation.

2) MÉDICAMENTS À ÉVITER PENDANT LES 3 JOURS QUI PRÉCÈDENT LE RENDEZ-VOUS : tous antibiotiques ; tous antiseptiques intestinaux (ERCEFURYL, INTETRIX) ; tous antiparasitaires (FLAGYL, FASIGYNE, FLAGENTYL) ; huile de paraffine ; suppositoires (sauf GLYCÉRINE ou RECTOPANBILINE) ; pansements intestinaux (SMECTA, CHARBON, ACTAPULGITE, BEDELIX, CARBOSYLANE, CARBOSYMAG, GAVISCON, KAOLOGAIS, MAALOX, PHOSPHALUGEL, POLYSILANE, POLYKARAYA...)

3) VOUS POURREZ RÉALISER en même temps d'autres types de prélèvements (sang, urines, gynécologie, ORL, mycologie...) lors de votre venue à jeun au laboratoire.

4) PREVOIR UNE ATTENTE DE 1h en moyenne (mais tout dépend de la vitesse de votre transit)

5) VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE RENDEZ-VOUS POUR L'EXAMEN DE SELLES :

Mais venez impérativement les lundis, mardis et samedis avant 11h00.